綜合报告

小地形对于气流的影响*

叶篤正

(科学院地球物理研究所)

提 要

本文总结了小地形对于气流的影响。文中着重地指出和讨论了过去背风波理论中的矛盾。作者认为这些矛盾是由于山的大小选择和上界边界条件的选择而引起的。当山的宽度的一半 $l \approx \frac{L_S}{2\pi}$ 时 $\left(L_S = \frac{u}{\sqrt{\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}}} \right)$, 和当大气中有一个固定的盖或不连续面存在时, 背风波出现。

在第一种情况下, 山的强迫振动与大气中的自由振动共鸣; 在第二种情况下, 只具有某些波长的振动可以存在, 这波长就是背风波的波长。这样的讨论背风波的物理意义就清楚了。

一. 引 言

山脉对于天气有显著的影响, 山的向风面和背风面雨量的分布不同, 就是一个明显的例子。再如焚风的现象以及山脉对于气流的阻擋等现象也是人所共知的。

自从航空事业发展以来, 飞行员们由实践的經驗中发现在山区里气流往往是很“乱”的, 而且垂直运动往往非常强, 因而飞机在山区里容易发生事故。气流由于山脉的阻碍作用后, 也常常形成很有规则的波状运动, 滑翔机的驾驶员们常常利用这种规则的上升运动作它的上升的动力。Küttner 曾经在这种气流中滑翔到 10.3 千米 (34000 英尺) 的高空中去, 最近更有人滑翔到 12.7 千米 (42000 英尺) 以上^[1]。由于实际上航空的需要, 在不同情况下, 山区里和山后 (对风向来說) 气流状况的研究便成为迫切的需要了。美国的所谓 Sierra Nevada Project 就是在这方面大规模地进行实际观测。

* 1956年5月10日收到。

另一类型的山脉作用则是对于比较大型的天气系统的發生和发展以及对大气环流的影响。自从气象事业发展以后,通过了实践,气象学者以及实际的预告工作者对于地形对天气系统的作用给予了应有的注意。在这方面欧洲 V₀ 低压的形成就是用地形作用来解释的。在北美洲的阿帕拉契尔地区气旋也常有显著的加深^[2]。么枕生^[3]在分析两湖地区气旋的发展时,也采用了地形作用的解释。

随着高空观测事业的发展,气象学者们的注意由地区性的环流扩大到为半球性的环流,于是对于大型环流特性的解释,也就有了不同的着眼点。一方面是着重在大地形方面的动力影响,在这方面可以 Bolin 的工作为代表。第二方面则完全着重在热力作用方面,这方面可以 Поросян^[5] 和 Sutcliffe^[6] 的工作代表之。事实上这两种作用是同时并存不可偏废的,近年来也有人^[7]将这两种作用结合起来解释大气环流的性质。

由上面的叙述可以看出,从小型的天气方面以至大型的大气环流方面其中都有一定的地形作用,这是我们气象工作者应当切实予以注意的。尤其在我国有世界上最高最大的西藏高原,它对东亚天气和环流的影响是不言而喻的,我国的气象学者对此已开始加以研究^[8,9]。今后还应开展地形的各种作用的研究,在开展这项工作之际,总结过去这方面的研究是适宜的。

地形作用可以分为两(极端的)类;一个是小地形,在研究这方面时我们可以不管地球自转的作用;另一个是大地形,在这里地球自转是必需考虑的。这两方面的影响和观测对象大有不同。本文仅将小地形的作用进行总结,大地形的作用在下次报告中再进行总结。

对于小地形作用中的背风波问题 Corby^[10]曾有过一个总结,但并不全面,在理论方面他的介绍只限于资本主义国家,没有包括苏联及新民主主义国家的学者的工作,同时它的论文亦未能提出各家不同的观点,这是一个缺陷。

二. 观测的事实

过去一般地认为山脉对于气流影响所及的高度不过为山高的二、三倍,最近的观测事实证明山的影响高度要比一般所想像的高得多,同时还比想像的复杂得多。无论是滑翔机或正式的飞机常常在山区里遇到非常强大的气流扰动,20米/秒的上升气流是常可遇到的,40米/秒^[11](8000英尺/分)的瞬时纪录都曾有过。这些观测即足以证明山脉作用的巨大和复杂。

早在1913年 von Ficker^[11]就用自由汽球(Free balloon)在山区中作实际空气质点轨迹的观测,这是非常有意义的。图1就是他所绘出的三个观测,在图1a和1b的情

形中我們很清楚地看出背風面的迴繞(loop)或渦旋,在圖 1b 的情形中汽球打了兩個渦

圖 1a. (依 von Ficker)

圖 1b. (依 von Ficker)

旋,总共用了 38 分鐘之久,渦旋的水平直徑約 1 千米,垂直距离为 300 米。在圖 1c 中更有一部分完全为上升气流。

圖 1 里所繪的是背風面的渦旋(Eddy),在向風面 Georgii^[12]也觀察到过渦旋,Georgii 并且指出向風面的渦旋在風速小的时候容易生成,在 10 米/秒以上的風速中則很少有渦旋。在 2—10 米/秒的風速中渦旋可以是常定的。对于背風面渦旋生成的風速条件 Georgii^[13]也有过討論,也認為在 10 米/秒以上風速中很少有渦旋。关于这点我們

圖 1c. (依 von Ficker)

在介紹 Förchtgott 的工作时仍將提及。

另外还有一种渦旋各为“轉子”(Rotor),它發生于背風波(lee wave)的波谷和波脊的地方。

当气流經過一粗糙地面时,在近地面層內就会有湍流發生,这湍流層的厚度与風速的大小和地面粗糙度(roughness)有关。可以想像气流过山时,在其最下層也一定有湍流層,在湍流層中一定有不規則的小渦旋發生。在湍流層之

上才是片流,因此气流过山时比較有規則的流綫被山所形成的湍流層抬高了,因此湍流層無形中等于把山加高和加大了,也就是擴大了山的影响。

上面所叙述的是山脉所引起的一些“不規則”的运动現象。在山脉另一方面也引起一些很規則的运动現象,就是所謂背風面的波动,这种波狀运动已完全被云的观测和滑翔机駕駛員所証明。依作者所知最早以仪器观测波动的仍是 von Ficker^[14]做的。von Ficker 將自計气压計系于自由汽球之上,如無垂直运动,則气压計所給的气压应几近于常值。von Ficker 令此汽球随風吹过山脊,过山时气流作波狀运动,于是自記气压紙上

顯出規則的气压变化曲綫。

在山的背風面我們常常可以觀測到成帶的云，兩個云帶之間為晴天，風雖然可以很強，可是云並不被風吹走；或者被吹走后僅幾分鐘內，云在同一地區又復生成。這就說明上升和下降運動是有固定地區的。气流在一定的地點上升，一定的地點下降，而成波狀運動。山區云的觀測資料很多，這裡不能一一舉例，不過這裡應該提出阿部^[15](Abe)，他在1932年即用自動照像法研究富士山上云的生成。1953年3月25日Larsson^[16]在瑞典北部的 Jämtland 山區曾觀測到25層很好的雲層，它們分布在由2—10千米的高空中，而那里山的高度不過1—1.4千米。在挪威山區上空21—24千米高度上的貝母云的生成，Störmer^[17]*歸之于地形，貝母云在其他地區也同樣可以觀測到。

除由云的觀測入手來研究背風波外，更直接的是可以由滑翔機進行觀測。隨着滑翔事業的發展，這種觀測資料愈來愈豐富。由觀測指出在有背風波出現時，其振幅自地面向上增加，到某高度后向上減小，而最後消滅。其波長通常在15千米以下，但波長到32千米的波也觀測到過。背風波的振幅迅速地向下游減小，在下游可以觀測到波的數目不多，但一般也有幾個。

在美國現在正在進行大規模的背風波的研究，所謂的“Sierra Nevada Project”在 Bishop (加州)進行觀測，因為那里有著名的“Bishop”波。在此處滑翔機會達12760米(42100英尺)^[1]的高空。冬季為“波季”，平均每四天出現一次，每有波出現時，25米/秒(500英尺/分)的垂直速度是常常可以出現的^[18]，40米/秒^[12]也曾記錄到過。在波動出現時，還常有陣風，強度可達12米/秒(40英尺/秒)^[18]，一般地比雷雨所出現的風速還要大。

根據多次在 Sierra Nevada 山區的觀測，Jenkins^[19]得到下列幾種特性云：1)“焚燻”云(Föhn wall)，可以把山遮蓋起來，它常伴隨着強度達25米/秒(500英尺/分)的下降气流。2)背風面旋轉云(rotor clouds)，它常伴隨強大的上升气流和嚴重的湍流；3)莖狀云(lenticular cloud)，在旋轉云之上；4)貝母云，高達25千米。

在介紹小地形的作用時，我們必須提出捷克學者 Förchtgott^{[20]**}的工作，根據在捷克 Bohemia 山地的研究，他總結出四種流場(圖2a—2e)簡述如下：

1) 無擾動的氣流：當風力很微弱時，流綫成為一孤立波(single wave)(圖2a)。

2) 渦旋氣流：風力較強，背風面出現常定的渦旋，由於此渦旋的原故，片狀流綫的脊出現于山脈的背風面，或者可以說山的有效形狀就改變了(圖2b)。

* 作者未談到Störmer的原文，由文獻[10]轉引。

** 作者並未讀到Förchtgott的原文，此處的介紹是由文獻[10]和[21]中Förchtgott工作介紹而編譯的。

3) 波状气流：風力更强，同时随高度增加，流綫呈波状，在波脊和波谷的地方有小轉子，这些小轉子的地方就是湍流的出現处(圖2c)。

圖 2a. (依 Förchtgott)

圖 2b. (依 Förchtgott)

4) 轉子气流 (rotor streaming)：風力很强，但其厚度限于 $1\frac{1}{2}$ 倍山的高度以下，其上風力微弱。在这种情况下渦旋之上無顯著的波动，湍流很强，对飛行極不利。当强風的厚度繼續減小时，流場則完全陷于不規則的状态(圖 2d—2e)。

Förchtgott 的總結是在兩個情况之下得出的：1) 空气中的層結是穩定的或至少是中性的，在不穩定的層結空气中Föchtgott 認為是不可能規則的过山气流的；2) 風向近于垂直于山脉。

根据上面的观测我們可以得到这样的結論：有利于“背風波”的生成条件有三：1) 穩定的空气層結。2) 風向近于垂直山脉。3) 風力較强而且随高度有一个急速的增加。这三个条件和 Küttner, Jenkins^[18] 和 Jenkins^[19] 在 Sierra Nevada 山区的总结經驗完全相同。

Förchtgott 的結論和 Georgii^[13] 的观测也是符合的，Georgii 認為常定背風渦旋只生成在較弱的气流里，这正是圖 2b 的情况。Georgii^[13] 还認為向風面上也可以有渦旋，它的生成条件也是風力不能大。Georgii 的向風渦旋可能就是 Förchtgott 圖 2 中向風面近地面的逆流，逆流和它上面的主流并不一定能構成渦旋。

为使飛行避免危險，Küttner 和 Jenkins^[18] 曾給出下列規則：1) 飛繞波动区域，或者在山脊的高度一倍半以上高度飛行。2) 不要飛進波动区域，

圖 2c. (依 Förchtgott)

圖 2d. (依 Förchtgott)

圖 2e. (依 Förchtgott)

3) 避免旋轉云。4) 避免“焚牆”云。5) 避免边界規則的筭狀云。这些規則虽是 Sierra Nevada 山区观测总结,但在其他地区也应该可以应用。

在結束本節之前,我們还應該提一下 Malkus 等^[22,23]在“热島”(heat Island)上的观测工作。在 Malkus 等所進行观测的島上沒有一处高出海面 150 米,因此地形作用可以略去不計,但在夏季,下午因島上受熱而引起的作用和山極为相似,也能產生与“背風波”相似的气流。

三. 过山运动的理論

按 Кибель^[24] 和 Charney^[25]在任何一运动場內地球自轉加速与慣性加速 (inertial acceleration) 之比为 $\frac{fL}{U}$, $f=2\omega\sin\varphi$ 为地球自轉參变数, L 为运动的特性長度, U 为特性速度。在中緯度 $f=10^{-4}$, $U=10^3$, 当 $L=10^7$ (100 千米) 时, $\frac{fL}{U}=1$ 。在这种运动場中地球自轉不能略去, 在 $L \ll 100$ 千米的情况下地球自轉才可以不考慮。所以在討論地形影响时, 如寬度小于 100 千米很多时, 我們可以不計入地球自轉影响。除 Queney 的工作以外, 现有关于背風渦旋和背風波理論的对象都是小地形的。

1. 过山气流中渦旋的產生

最早 von Ficker^[11]認為背風渦旋是由于气流在山后受“吸引作用”(suaking action)的緣故。这种解釋顯然不能成立, 因为我們在圖 2a—2e 中有渦旋的地方很难看出“吸引作用”。Georgii^[12]則認為渦旋生成的必要条件为地面的逆流, 近地面逆流的生成条件可由边界層理論找出。下面的討論虽然是根据不可压缩的均匀的流体出發, 但是在我們所討論的大气層(近地面)里是可以適应的。近地面層的大气的層結(stratification)常常是中性的, 如果不考慮粘滯性, 这層里的运动可以說“位势流动”(potential flow), Scorer^[41]称之为“空气动力学流动”(aerodynamic flow), 即此層中的气压可由通常的空气动力学求出。

圖 3 为流体流过一障碍物的情况, 在 C 点速度廓綫(velocity profile)与地面相切, 自此点起某流綫开始在地面層將流体分为二个流向相反的部分, C 以右有逆流而生成渦旋。

圖 3.

產生 C 处速度廓綫的条件可由 Prandtl^[26] 理論找出。在 $s=0$ ($u=w=0$) 时, 边界層的微分方程为:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial x}, \quad (1)$$

其中 μ 为渦旋动粘性(eddy-viscosity), 圖

3中C以右的速度廓綫的曲率为正，故產生逆流的必要条件为 $\frac{\partial p}{\partial x} > 0$ ，因为边界很薄，其内的压力可以其外的压力替代之（即略去重力影响）。在边界層以上的常定运动可以假設服从 Bernoulli 方程，于是 $\frac{\partial p}{\partial x}$ 可以 $-u \frac{\partial u}{\partial x}$ 代替。今 u 为正，故使 $\frac{\partial p}{\partial x} > 0$ ，需 $\frac{\partial u}{\partial x} < 0$ 。所以產生渦旋的条件为流体在其前進过程中要减速。当然有 $\frac{\partial u}{\partial x} < 0$ 或 $\frac{\partial p}{\partial x} > 0$ 时，逆流不一定能產生，这要看由 $\frac{\partial p}{\partial x} > 0$ 產生的减速，和地面摩擦作用能否使流体已有的速度变为負值。

根据上述理論圖 2b 的背風渦旋是可以解釋的，可以想像当气流經過山脊后，其活动空間加大，速度减小，故 $\frac{\partial u}{\partial x} < 0$ ，其值的大小可以假設与 u 成正比例，所以要使 $-u \frac{\partial u}{\partial x}$ 發生作用时， u 不能太小。反之如 u 太大时，可能在原有的速度未被变成負值时，所討論的情况已不適合。同时我們还知道边界層的厚度与 $\sqrt{u}$ 成反比，速度太大边界層太薄也是与背風渦旋的產生是不利的。另外速度过大时片狀的边界層將变成湍流狀的边界層，很难希望能在湍流中有常定渦旋。当速度过大时我們就進入 Förchtgott 的“轉子气流”了。

2. 过山运动的波动理論(平面問題)

关于背風波的存在已由丰富的觀測資料証实，引導着关于背風波理論的起源，最早可以推到 Kelvin，其后为 Lamb，在 1920 年左右 Ekman 討論过海底的起伏对于海流的作用。真正背風波理論应当从 Кочин^[27,28]說起，他采用兩層模式，上下兩層的流体都是不可压缩和正压的，具有不同的常定速度。当下層流体遇着障碍物时，在向風面的界面上几乎沒有波动存在，而在背風面則出現波狀运动。繼Кочин之后，Дородницын^{[29,30]*}所采用的兩層大气都是斜压的，兩層的流速也不相同，在这項研究中的重要結果是在垂直方向上有不同的波系產生，这些波动随着高度而改变符号，不和山形符合。在不可压缩的流体和正压流体是不可能不同波系的。

1950 年 Дородницын^[32] 又發表了一篇过山运动的文章，在該文里作者采取了兩度空間、常定、絕热、無質量輻散和無粘滯性的假定，得出下列方程：

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial \xi} &= \frac{\rho}{\rho_{\infty}} \left[\bar{u}'_{\infty} + \frac{\pi}{2} \frac{\bar{u}_{\infty}}{\tau_{\infty}} \left(\frac{\bar{V}^2}{\bar{u}_{\infty}^2} - 1 \right) + \frac{\pi}{Fr} \frac{\eta_1 - \eta_{\infty}}{\bar{u}_{\infty} \tau_{\infty}} \right] \left(\bar{u}'_{\infty} = \frac{d\bar{u}_{\infty}}{d\eta_{\infty}} \right), \\ \frac{\rho}{\rho_{\infty}} &= \left(1 - m \frac{\eta_1 - \eta_{\infty}}{\tau_{\infty}} \right)^{\frac{1}{\pi-1}}, \\ \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial \eta} &= \frac{\pi}{\pi-1} \frac{\bar{v}}{\tau_{\infty}}, \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

* 本文作者未能直接看到Дородницын的这两篇文章，这里的結論是作者由Петренко^[31]一文中关于Дородницын的工作总结出來的。

其中 $m = \frac{H(\gamma_a - \gamma)}{T_0}$, $Fr = \frac{u_0^2}{gH}$, $m = \frac{\gamma_a H}{T_0}$. 上式中各种符号的意义如下:

$$\xi = \frac{x}{H}, \eta = \frac{y}{H} \quad (y \text{ 为高度}), \bar{u} = \frac{u}{u_0}, \bar{v} = \frac{v}{u_0}, \bar{V} = \frac{V}{u_0} \quad (V \text{ 为风速绝对值}), \bar{U}_\omega = \frac{u_\omega}{u_0},$$

H 为对流层顶的高度, γ_a 和 γ 各为绝热和实际大气中的温度递减率, κ 为两种比热的比值, $\tau = T/T_0$, T 为温度, “0”表示未扰动前地面值, “ ∞ ”表示未扰动前任意高度上的值. 所得到上式的过程中略去了含有风速平方和声速平方比值的小项.

在正常大气中 $u \approx 0.15$, $\frac{1}{Fr}$ 变化大, 可由几百到几千, 如扰动前与扰动后的空气质点高度差 $\eta - \eta_\infty \approx 0.1$, 则(2)中第一式右边第三项的数量级为 10 或 10 以上, 同式中右边其余两次的量级为 1 左右, 故可略去. 因为 $m \approx 0.4$, 故(2)中第二式可以写成 $\frac{\rho}{\rho_\omega} \approx 1$. 在垂直方面的特殊高度小于 H (量级为 $0.1 H$) 很多, 因此(2)中第三式右边的一项显然很小于左边的第二项, 故可略去. 于是方程式组(2)可以写成

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial \xi} &= \frac{\kappa}{Fr} \frac{\eta - \eta_\infty}{\tau_\omega u_\omega}, \\ \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial \eta} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

以 $s = \xi, t = \eta_\infty(\xi, \eta)$ 为新的独立变数, 则

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial}{\partial s} + \frac{\partial \eta_\infty}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} + \frac{d\eta_\infty}{d\gamma} \frac{\partial \psi}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} - \frac{\rho v}{\rho_\omega u_\omega} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} - \frac{\rho}{\rho_\omega} \frac{\bar{v}}{\bar{u}_\omega} \frac{\partial}{\partial t},$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial \eta_\infty}{\partial \eta} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\rho u}{\rho_\omega u_\omega} \frac{\partial}{\partial t},$$

其中 ψ 为流函数. 由上式可以看出方程式组(3)是非线性的. 因为(2)式右边的一项和 $(\gamma_a - \gamma)$ 成比例, Дородницын 认为流体的斜压性在过山运动中是重要的, 由 $(\gamma_a - \gamma)$ 看来 Дородницын 所称的斜压性就是 Queney 和 Scorer 等所称的大气中的稳定度.

设小扰动线性化后, 同时并设 u_ω 为常数, 以 $s (= \xi)$ 和 $z (= 1 - \frac{2H}{T_0} \eta_\infty)$ 为新独立变数, $\omega = z^\alpha \theta$ 为代解的变数, 则 Дородницын 得下面的微分方程:

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \omega}{\partial s^2} + \left(\frac{k^2}{z} - \frac{\delta}{z^2} \right) \omega = 0, \quad (4)$$

这里 θ 为速度向量与 ω 轴的交角, $\alpha = \frac{1}{2} \left[\frac{\kappa}{\kappa - 1} \frac{\gamma}{\gamma_a} - 1 \right]$, $c = \frac{\gamma H}{T_0}$, $k^2 = \frac{1}{\kappa - 1} \frac{\gamma_a}{\gamma}$

$\left(\frac{\gamma_a}{\gamma} - 1 \right) \frac{\kappa R T_0}{u^2}$ (R 为气体常数), $\delta = \frac{1}{4} \left(\frac{2 - \kappa}{\kappa - 1} \frac{\gamma_a}{\gamma} + 1 \right) \left(\frac{2 - \kappa}{\kappa - 1} + 3 \right)$. 解方程(4)时

Дородницын 所用的边界由条件为: 1) 地面廓线为一流线, 即 $\omega(s, 1) = \Phi(s)$, 2) 在 H 的

高度上無擾动。在此边界条件下, (4) 式的解为

$$\theta = z^{-a} [\Phi(z) \omega_0(z) + \sum_1^{\infty} f_n(z) \omega_n(z)], \quad (5)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{其中 } \omega_0(z) &\cong c \sqrt{Z} \left[\cos 2k(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) - \frac{\varphi(z)}{k} \sin 2k(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) \right], \\ \varphi_1(z) &= \left(p + \frac{1}{4z_0} \right) \sqrt{z_0} - \left(\delta + \frac{3}{16} \right) \frac{1}{\sqrt{z}}, \\ c &= 1: \left[\cos 2k(1 - \sqrt{z_0}) - \frac{\varphi_1(1)}{k} \sin 2k(1 - \sqrt{z_0}) \right], \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

p 为与 γ_a, γ 和 z_0 有关的常数。(5) 式中第二项为波动项(在 ω 方向), 流綫的形状主要为第一项决定, 第二项是加于第一项之上的小波动, 它的形式此处不再给出。(6) 式很清楚地指出穩定度在过山运动中的作用, 在中性大气中, $k=0$, 流綫形式为山形决定, 在上坡的地方流綫上升, 下坡的地方流綫下降, 在垂直方向上沒有不同波系產生。只有在穩定的大气中 $k^2 > 0$, 才会有不同波系產生。

Дородницын 以 η_{ω} 未受擾动前的高度为变数, 在他的地面边界条件里 $\eta_{\omega} = 0, \omega = 0$, 这比一般的方法好。一般地面取 $z=0, \omega = u \frac{\partial \zeta}{\partial x}$ (此处 z 为高度, x 为水平距离), 这里就有了近似, 因为嚴格地应该用 $z = \zeta, \omega = u \frac{\partial \zeta}{\partial x}$ 。在 Дородницын 工作中就沒有这个近似。

在 Дородницын 的前兩篇工作之后(1938—1940)又有 Lyra^[33] 的研究, Lyra 所取的山形为立方体, 也得到了背風波。但 Scorer 指出^[38], Lyra 的背風波的產生是由于所取的特殊地形的緣故, 如將由 Lyra 所取的山形流綫化, 則背風波就沒有了。

其他气象学者如 Küttner^[34], Eliassen^[35] 也对于过山运动有过理論的討論。尤其是前者在实践方面有很多的重要貢獻。然而在理論方面他們的工作都不重要。Eliassen 討論的对象不是流綫或速度, 而是空气質点在擾动过程中所升高的高度, 而不研究背風波, 所以这里不予介紹。

近年來, Queney^[36, 37] 和 Scorer^[33-41] 对于过山运动有比較完整的理論。Queney 的对象是具有均一層結 ($S = \sqrt{\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}}$, g 为重力加速, θ 为位温) 和均一風速(u) 的大气。他取了兩种地形, 一种是正弦式的, 另一种为單一山脊:

$$Z = \frac{b}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}, \quad (7)$$

其中 b 为山高, a 为山的寬度的一半。前一种地形沒有实际意义, 我們不予以介紹。下面是 Queney 对于單一山脊的研究。

Queney 按山的半宽度 a 的大小, 将地形分成几类, a 大小的测量是以 $k_s (=s/u)$ 为准。当 a 很小时, ($a \ll \frac{1}{k_s}$), 大气稳定度的影响可以略去不计, 这时流线的垂直位移为:

$$\zeta = \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} \frac{b}{1 + \left(\frac{x}{a+s}\right)^2}, \quad (8)$$

扰动向上减小, 向水平方向也减小。向风面和背风面都没有波动, 垂直方向上流线也没有位相的改变。

当 $a \gg \frac{1}{k_s}$ 时,

$$\zeta = b \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} \frac{\cos k_s s - \frac{x}{a} \sin k_s s}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}, \quad (9)$$

在这里我们注意到大气稳定度已很重要, 不能略去。(9)式指出一个重要的结果, 就是在具有稳定度的大气里, 在 Z 的方向上可以有不同的波系产生, 此点 Дородницын 已于 1938—1940 年的工作中指出。而在这种情况下, 向风面和背风面都没有波动(水平方向)。

当 $a \approx \frac{1}{k_s}$ 时, Queney 得下面的方程式:

$$\zeta = \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} (k_s a) b \int_0^\infty \exp i (\omega' t + s' \sqrt{1-t^2}) dt \quad (\text{实数部分}), \quad (10)$$

其中 $\omega' = k_s(x + i a)$, $s' = k_s s$ 。Queney 将以上积分写成 Bessel 函数的级数, 并绘出此种情况下流线图的例子。在图里我们清楚地看到了一个主要现象——背风波, 然而在向风面仍然没有波动。这是与下面将要介绍的 Scorer 的理论不符合的。Scorer 认为在层结均一和风速均一的大气里是没有背风波动可以产生的。关于二人的矛盾留在下面讨论。

Scorer 的过山运动的微分方程基本上是和 Queney 一样的, 不过考虑了风速随高度的变化, 他的方程如下:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial z^2} - \left(\frac{g}{c^2} + \beta \right) \frac{\partial w}{\partial z} + \left(\frac{g\beta}{u^2} - \frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - k^2 \right) w = 0, \quad (11)$$

其中 c 为声速; $\beta = \frac{1}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}$, θ 为位温; g 为重力加速; k 为扰动在 x 方向的“波数”(wave number)(在 x 方向的扰动为 e^{ikx})。Scorer 略去了 $\frac{\partial w}{\partial z}$ 项, 并令 $l^2 = \frac{g\beta}{u^2} - \frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ 。于是(11)式变为

$$w'' + (l^2 - k^2)w = 0, \quad (12)$$

取山形为(7)式,在 $l=0$ 情况下的解答与(8)式一样,不过没有 $\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}}$.在 $l^2=$ 常数情况下,解答与(9)式相似,不同者,Scorer解答中没有 $\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}}$,同时(9)式分子中的减号变成了加号.这里加减号的不同是由于上界边界条件所取的不同而来,关于边界条件的问题,我们以下还要讨论.

Scorer的结果修正了以前的结论,就是在过山运动中不同波系的产生条件并非唯一的决定于大气稳定度的存在.在中性大气中适宜的风速随高度变化也可以产生不同的波系,在稳定大气中有适宜的风速随高度变化,不同波系也可以不产生.不同波系的产生条件是稳定度与风力随高度变化二者综合的结果.

如 l 为常数,同时在背风面的地面($z=0$)和无穷高处($z \rightarrow \infty$) $w=0$,则按(12)式任何高度的 w 皆为零,也就是没有背风波的可能.在有背风波的情况下,同时在 $Z=0$ 和 $z=\infty$, $w=0$ 时, $\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}$ 至少要变号一次. Scorer认为这个条件就是 l^2 要向上减小.

他取了二层或三层模式,在同一层中 l^2 为常数,上层的 l^2 比下层的小.在这种模式下 Scorer得到了背风波,图4就是他的二层模式的流线.

图4. (依 Scorer)

3. 三度空间的问题

以上所介绍的都局限于二度空间的问题, Дородницын曾提到过三度空间的问题,但因无此资料,不能予以介绍.苏联另一学者Кибель[4]

对此亦曾加以讨论.他的对象是常定的和绝热运动的理想流体,其中的“基本”风速为与 x_1, y_1, z_1 无关的 u ,基本流场中的温度为 z_1 的线性函数,即 $\frac{\partial T_1}{\partial z_1} = -\gamma =$ 常数.他的微分方程为:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \frac{\partial^2 W}{\partial z^2} + D^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) W = 0, \tag{13}$$

其中 $W = \rho w e^{\frac{H \gamma_a - \gamma}{2T} z}$; $D^2 = g \frac{\gamma_a - \gamma}{u^2 T} H^2 \left(x, y, z = \frac{x_1}{H}, \frac{y_1}{H}, \frac{z_1}{H}\right)$; T 平均温度; g 重力加速; γ_a 绝热梯度.

Кибель还认为运动发生于某层空气之内,其厚度在向风面的无穷远处为 H ,其上空是处于静止状态,因此他的边界条件为:

当 $z=0$ 时, $W = \rho_0 u \frac{\partial \zeta}{\partial x}$,

当 $z=1$ 时, $W=0$.

$\zeta = \zeta(x, y)$ 为山在空间的方程式。(13)式之解为:

$$W = 2 \frac{\rho_0}{\rho} e^{-\frac{H \gamma a - \gamma z}{2T}} u \sum_{n=1}^{\infty} n W_n(x, y) \sin n\pi z, \quad (14)$$

其中

$$W_n(x, y) = -\int_0^{\infty} \frac{\lambda^2}{2Q} \int_0^{\infty} \cos m(y-\eta) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda(x-\xi)} \zeta(x, y) d\xi - \int_x^{+\infty} e^{\lambda(x-\xi)} \zeta(\xi, \eta) d\xi \right] d\eta dm + \int_0^{\infty} \frac{\gamma^2}{Q} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos m(y-\eta) \int_{-\infty}^{+\infty} \cos y(x-\xi) \zeta(x, y) d\xi d\eta dm, \quad (15)$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{2}(Q-D^2+n^2+n^2\pi^2)}, \quad \nu = \sqrt{\frac{1}{2}(Q+D^2-m^2-n^2\pi^2)},$$

$$Q = \sqrt{(D^2-m^2-n^2\pi^2)^2 + 4D^2n^2}. \quad (16)$$

对于两度空间的问题, $\zeta = s(x)$, 则

当 $n \leq n_0$, $W_n(x) = -\pi \int_{-\infty}^x \cos \sqrt{b^2 - n^2\pi^2} (x-\xi) s(\xi) d\xi, \quad (17a)$

当 $n > n_0$, $W_n = -\frac{\pi}{2} \left[\int_{-\infty}^x e^{-\nu \sqrt{n^2\pi^2 - b^2} (x-\xi)} s(\xi) d\xi - \int_x^{\infty} e^{\nu \sqrt{n^2\pi^2 - b^2} (x-\xi)} s(\xi) d\xi \right], \quad (17b)$

其中 n_0 满足 $D^2 - n^2\pi^2 = 0$.

回到三度空间的问题, 令山集中于坐标原点的地方, 即 $b = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} \iint \zeta(\xi, \eta) d\xi d\eta$,

则

若 $x < 0$, $W_n(x, y) = b \int_0^{\infty} \frac{\lambda^2}{2Q} \cos my e^{-\lambda x} dm, \quad (18a)$

若 $x > 0$, $W_n(x, y) = -b \left[\int_0^{\infty} \frac{\lambda^2}{2Q} \cos my e^{-\lambda x} dm + \int_0^{\infty} \frac{\gamma^2}{Q} \cos \gamma x \cos my dm \right]. \quad (18b)$

由(17a), (17b)和(14)式我们不难看出在两度空间的问题中, 是有背风波存在的。

兹以山形

$$s = A e^{-a|x|} \quad (a > 0)$$

为例, 则(17a)和(17b)为:

当 $n \leq n_0$ 时,
$$W_n(x) = -\pi A \int_0^{\infty} \cos \sqrt{D^2 - n^2 \pi^2} (x + \xi) e^{-\alpha \xi} d\xi -$$

$$-\pi A \int_0^x \cos \sqrt{D^2 - n^2 \pi^2} (x - \xi) e^{-\alpha \xi} d\xi = \pi A \frac{\alpha (e^{-\alpha x} - 2 \cos \sqrt{D^2 - n^2 \pi^2} x) (x > 0)}{D^2 - n^2 \pi^2 + \alpha^2}; (17a')$$

当 $n > n_0$ 时,
$$W_n(x) = \pi A \frac{\alpha e^{-\sqrt{n^2 \pi^2 - D^2} x} - 2 \alpha e^{-\alpha x}}{n^2 \pi^2 - D^2 + \alpha^2} (x > 0). (17b')$$

由(17b')我們可以看出 $W_n(x)$ 很快地随 n 的增加而减小, 可以(14)式所給出的 W 值决定于前几項。因此 W 在水平方向的分布决定于(17a'), 是一个波狀的分布。

在 Кибель 所討論的大气里, 風速是均一的, 層結也是均一的。按 Scorer 的理論, 在这种大气里, 不應該有背風波, Кибель 和 Scorer 的矛盾在下面再進行討論。

在 Кибель 以后苏联另一学者 Мусаелян^[43]更在球体空間中討論了过山运动, 在这里地表面曲率和地球自轉的影响自然就考慮在問題之中。地球曲率的作用在 Мусаелян 以前是沒有人考慮的, 对地球自轉的作用則 Queney 有过討論。对于很小的地形, 則這兩項作用都是可以略去的。

四. 边界条件

背風波問題在微分方程里是一个边界值問題, 地面和高空边界条件决定了解答的形式。对于地面条件大家都一致地采用了 $z=0, w = u \frac{\partial \zeta}{\partial x}$ 。对于高空条件資本主义國家的学者們采用了 $z \rightarrow \infty, w=0$ 。采用这种边界条件, 就常常会遇到下面的困难, 使(12)式的基本解答成为

$$w = A e^{\mu z} + B e^{-\mu z},$$

其中 $\mu = +\sqrt{k^2 + l^2}$ 。这里有兩種情况: 1) μ 为实数, 即 $k > l$, 則 $A=0$, 否則当 $z \rightarrow \infty$ 时, $w \rightarrow \infty$ 。2) $\mu = i\nu$ 为虛数, 即 $k < l$, 則 $z \rightarrow \infty$ 时 $e^{\mu z}$ 和 $e^{-\mu z}$ 都是不定式, 这就發生了高空条件無法应用的困难。解决这个困难 Queney (Lyra 也如此) 采用了 Rayleigh 的方法, 在極限情况下引進了摩擦力, 在 $e^{i\nu z}$ 項中有 $e^{-\varepsilon z}$, 在 $e^{-i\nu z}$ 項中有 $e^{\varepsilon z}$, $\varepsilon > 0$ 。因此我們必需使 $B=0$ 。Scorer 認为地形是擾动的源, 所以解必需代表自下向上傳的波, 而不能是自上向下進行的波, 因此 Scorer 使 $A=0$ 而留下 $w = B e^{-i\nu z}$, B 則由地面条件决定。

由上面的討論我們看出, 在过山运动中的理論解答不是唯一的。Palm^[43]認为如果唯一的解答存在的話, 它一定是对称的, 如果山形是对称的, 即向風面与背風面的运动是对称形式的。这由运动方程可以看出, 在略去地球自轉后的运动方程为:

$$\vec{V} \cdot \nabla V = -\frac{1}{\rho} \nabla p + g, (19)$$

設某解 $\vec{V}$ 就可以給出背風波, 如令 ρ 和 p 不变, 而將 $\vec{V}$ 变号, 此新解仍適合(19)式, 也就是在向風面也有波。如只要背風波, 不要向風波, 則必需有附加条件。Queney 及 Lyra 引入了摩擦項, Scorer 不取向下進行的波, 这都是附加条件。然而如將过山运动当作起始和边界条件來解, 則起始条件可以看作附加条件, 在(23)式中取 A 或 B 的問題自然解决。Hoiland^[43] 就是这样進行的, Palm 在 Hoiland 之后采用了同样的方法。

起始条件虽然解决了当 μ 为虛数时的困难, 然而起始条件如何取, 什么是合理的起始条件? 是一个新的困难。顯然 Hoiland 和 Palm 所取的办法是可以怀疑的, 他們假設在 $t=0$ 以前完全没有运动, 均匀运动突然于某时發生, 这是最簡單的办法。然而背風波是否由于起始条件發生是个疑問。

苏联学者們如 Дородницын, Кибель 和 Мусаелян 則采取了另一办法, 他們不將上界放在 $s \rightarrow 0$, 而放在 $s = H$, 在此高度上無擾动。这使当 μ 为虛数时所發生的困难得到解决。可以想像山的影响(尤其是小地形)不会到达整个大气層, 因此必然存在一个高度 H , 在此高度上擾动为零。然而 H 为多少高, 是个难以回答的問題。如果擾动是指指数向上减小时, 則这个高度更是难以确定。苏联学者們倾向于將此高度放在对流層頂, 对于某些問題, 这顯然偏于过低, 因为一般認為貝母云之形成属于地形的作用, 而貝母云的高度在 26 千米以上。对于背風波的問題这个高度可能过高。

一般認為地面的边界条件沒有問題, 都是采取

$$w_0 = u \frac{\partial \zeta}{\partial x},$$

其中 $s = \zeta(x, y)$ 为山形。这無形中等于假定了气流是爬山而过的, 而在实际情况中, 必定有一部分, 还可能是一大部分气流是繞山而过的, 这繞山而过的条件在上式中是沒有表示出。这个繞山而过的問題是無法用小擾动为理論來考慮的。

总之边界条件在过山运动中是一个有待解決的問題, 由于不同作者采用了不同的边界条件, 过山运动而有不同的理論解答。

五. 背風波的物理

前節已經指出 Queney 和 Scorer 結論的一些矛盾, Кибель 和 Scorer 結論的一些矛盾。由于他們之間的矛盾結論使我們可以進一步探討背風波生成的理論。

我們注意到 Queney 和 Scorer 的結果在許多地方是相似的, 只是在某种情況下 Queney 在風速均一和層結均一的大气里將到了背風波的解; 而根据 Scorer, 則背風波

* 作者未讀到 Hoiland 原文, 只看到 Palm 对于該文的總結。

在这种大气里 ($l^2 = \text{常数}$) 是不能存在的。Queney 所用的条件是 $a \approx \frac{1}{k_s}$, 这指示我們 Queney 所得的背風波是共鳴的結果, 因为在这时候山在大气中所引起的强迫振动 (波長以 $\frac{1}{k_s} = \frac{u}{s}$ 为度量) 是相当的。因而背風波生成的一种物理現象就是共鳴。

在均一的風速和層結的大气中, Кибель 也同样得到背風波, 但是在 Кибель 的問題中 a 不一定 $\approx \frac{1}{k_s}$ 。出來的波長也不与 a 有关, 可是我們注意到 Кибель 和 Scorer 所取的上界条件是不同的。前者的条件是当 $z=H$ 时 $w=0$ (相当于上界为一个固定的盖); 而后者为当 $z=\infty$ 时 $w=0$ 。在有盖的大气中只有某几种波長的波可以存在 (波長决定于 H), 因此这几种波長的波在这种大气里就出現了。在無盖的大气中就無此种性質, 于是背風波也就不会出現。

为了深入說明这一点, 我們將 Scorer 的微分方程 (12) 式中的 w 換为流函数 ψ (这是可以的, 因为 $w = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$), 令 l^2 为常数, 边界条件为:

$$\text{当 } z=0, \quad \psi = \frac{ba}{\pi(x^2+a^2)} = \frac{b}{\pi} R \int_0^{\infty} e^{-ka+ik} dk,$$

$$\text{当 } x=H, \quad \psi = 0.$$

其中 R 表示取积分的实数部分。我們的解为

$$\psi(x, z) = \frac{b}{\pi} R \int_0^{\infty} \frac{f(k, z)}{f(k, 0)} e^{-ka+ikx} dk, \quad (20)$$

其中

$$f(k, z) = e^{a\sqrt{k^2-l^2}} - e^{\sqrt{k^2-l^2}(H-z)}. \quad (21)$$

(20) 式可以用周界积分的方法求出, 积分路綫如图 5。当 $X > 0$ 时取路綫 C_1 , 当

圖 5.

$X < 0$ 时取 C_2 。圖中 $\theta = \tan^{-1} \frac{u}{a}$ 。(20) 式积分号中的奇异点除 $k=l$ 外都是極点。 $k=l$ 既为極点又为分支点, 但該点在正积分路上。因为 $2H > z$, 所以当 $k \rightarrow \infty$ 时, 积分号内的被积函数不趋于無限, 故 $k \rightarrow \infty$ 不是奇异点。極点可以由下式求出:

$$f(k, 0) = 1 - e^{2H\sqrt{k^2 - l^2}} = 0,$$

$$\text{得 } k_j = \sqrt{l^2 - \frac{n^2 \pi^2}{H^2}} \quad (j=0, 1 \dots n_1; \quad n=0, 1 \dots n_1, \quad n_1 \leq \frac{lH}{\pi}).$$

由残数定理, (20)式的解为:

$$\begin{aligned} \psi(x, z) = R \left\{ \frac{b}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{x\sqrt{r^2 - l^2}} - e^{2H - 2\sqrt{r^2 - l^2}}}{1 - e^{2H\sqrt{r^2 - l^2}}} e^{-r\sqrt{a^2 + z^2}} e^{i\theta} dr + \right. \\ \left. + 2ia \sum_{j=0}^{n_1} \frac{f(k_j, z)}{f'(k_j, 0)} e^{-k_j a + j k_j x} \right\} \quad (x > 0), \end{aligned} \quad (22)$$

其中

$$f'(k_j, 0) = \left. \frac{\partial f}{\partial k} \right|_{k=k_j}, \quad x=0.$$

很容易看出上式的积分符号内的函数迅速地随 γ 的增加而减小, 当 x 较大时, 尤其如是。所以我们近似地将 $\gamma=0$ 代入被积函数的第一部分, 于是

$$\begin{aligned} \psi(x, z) \cong \frac{b}{\pi} \frac{f(0, z)}{f(0, 0)} \frac{a}{a^2 + z^2} + \sum_{j=0}^{n_1} \frac{(l^2 - k_j^2)^{\frac{1}{2}} e^{-k_j a}}{2k_j} \left\{ \cos[(s - 2k) \sqrt{l^2 - k_j^2} - k_j x] - \right. \\ \left. - \cos[(s - 2k) \sqrt{l^2 - k_j^2} + k_j x] \right\} \end{aligned} \quad (23)$$

在向风面 ($x < 0$) 可同样求出类似的公式。如令 $x \rightarrow -\infty$ 时, 无扰动, 则当 $x < 0$ 时, 只有 (23) 式中的第一项。

由 (23) 式我们可以看出在风速均一和层结均一的大气里, 是可以有背风波的, 只要上界 $z=H$ 不趋于无限。

Scorer^[39, 41] 还认为背风波生成的条件是 l^2 足够地向上减小, 但这不是足够的条件。按 Queney^[36] 设 $u = u_0 + u' z$, $\beta = \text{常数}$, 则 $l^2 = g\beta / (u_0 + u' z)^2$, 向上迅速地减小。取山形 $z = \frac{a^2 b}{a^2 + z^2}$, 则解答为

$$dz = ab e^{Sz} \sqrt{\frac{u_0}{u}} \frac{a \cos\left(m \ln \frac{u}{u_0}\right) - x \sin\left(m \ln \frac{u}{u_0}\right)}{a^2 + z^2},$$

这里用了 Queney 的符号, dz 为垂直方向的扰动, $S = -\frac{1}{2\rho} \frac{\partial \rho}{\partial z}$, $m = \frac{1}{4} \sqrt{gS - \frac{u'^2}{4}}$, $s = 2S - g/c^2$, c 为声速。由上式看是没有背风波的。

应当指出在我们这种大气里, $x \rightarrow \infty$ 时风速 u 亦 $\rightarrow \infty$, 这不一定是合理的。在这种情况下, 通常所采用的上界的边界条件 $w=0$ 是颇有可讨论之处的, 因为可以想像在非常高的地方 w 是可以很大的。

由上面的讨论我们可以看出, 背风波的生成主要是由于两种物理作用: 第一是山所引起的振动与大气的自由振动共鸣; 第二是大气上界的盖所起的, 在这种大气里只有某

几种波長的波可以存在,它們就顯露出來了。Scorer 所以得到背風波,不是因为在他的大气模式里 l^2 是足够地向上减小,而是因为 l^2 的不連續。在某种意义上不連續面和固定的盖是相同的作用。因此我們可以說產生背風波的第二种物理作用是大气中的不連續面。这是符合观测事实的, Jenkins^[19] 和 Küttner 与 Jenkins^[18] 都指出逆温層或至少穩定層(600毫巴以下)几乎是背風波的必需条件。不难由实际計算的例子看出,背風波的振幅是随不連續面或大气上界的高度而减小的,当 $H \rightarrow \infty$, 振幅亦为 0。

我們要問是不是有第三种產生背風波的作用呢? 如在某种大气里 l^2 随高度分布曲綫呈某种性質时, 而有不穩定的性質, 因而產生背風波是可能的。

为更深入地了解背風波生成的条件, 我們还应当提一下大气穩定度的重要性。过去許多作者都曾指出在中性大气中, 在过山运动中是沒有不同的波系的。这个結論僅僅在風速均一的或風速直綫上升的大气中才正确。Scorer 已將 l^2 代替大气穩定度來討論过山运动了, 按 Scorer 在 $l^2=0$ 时才沒有不同波系產生的說法, 在中性大气中, 只有 $u = \text{常数}$ 或 $u = u_0 + u'z$ (u' 为常数) 时, l^2 才能等于零。在这种風速分布下 $l^2 = g\beta/u^2$, 这时大气穩定度的作用就充分地表現出來。

最后应当指出当 $l^2=0$ 时, 在任何情况下(大气有盖或無盖)都是沒有背風波的。因为当 $l^2=0$ 时, (22) 式中的 $n_1=0$, 所以 $k_0=0$, 將 $k_0=0$ 代入 (22) 式右边第二項, 波狀的解就不存在了。所以 $l^2=0$ 在 Кибель 的情况中相当于 $\gamma = \gamma_a$ (因为 $u = \text{常数}$), 于是 $D=0$, $n_0=0$ (17b') 不能存在, Кибель 的波解也就沒有了。

六. 总 結

地形对于过山气流影响之大可以完全由上面的討論看出, 它影响所达的高度往往可以到达对流層頂以上。而它的影响所能达到的水平距离不过它垂直距离的数倍(以背風波所能存在的范围為度量), 如以水平風速为 10 米/秒, 則它的垂直風速可达每秒数米的量級, 所以在过山运动中, 人們常常过到强大的上升或下降气流。

过山运动是非常复雜的, 在复雜的运动中有两种有規則的現象, 一个是渦旋运动, 另一个是背風波。渦旋的產生可以用 Prandtl^[26] 的边界層理論解釋之。背風波的生成主要是由下列两种作用而生。当山所引起的强迫振动与大气中某种特性的自由振动的波長相当时, 則發生背風波。在大气中有以下几种特性的自由振动, 1) 是与大气穩定度有关的自由振动, 其波長为 $u / \sqrt{\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}}$, θ 为位温, u 为風速。2) 是与風速切变有关的自由振动, 其波長为 $1 / \sqrt{\frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}}$, Scorer 以 $l^2 = \left(\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} / u^2 - \frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$ 將这两种特性

振动联系了起来。3)是与地轉自轉參变数(f)有关的自由振动,其波長为 u/f 。4)是与随緯度变化有关的自由振动,其波長为 $\sqrt{u/\beta}$, $\beta = \frac{df}{dy}$ 。在小地形的討論中,地球自轉可以略去不計,所以在背風波的理論中只有前二种是重要的。

第二种背風波的產生則是上界边界条件的作用,在 $z \rightarrow \infty$, $w=0$ 不產生波动的大气中,加上固定的盖(即 $z=l$, $w=0$),則有背風波發生。在有不連續面存在的大气中也有背風波發生,在某种意义下,固定盖与不連續面的作用是相同的。在大气里是沒有固定盖的,因此第二种背風波主要是不連續面產生。

由上面的討論我們可以看出在背風波理論中,上界的边界条件的選擇是重要的,不像 Corby^[10]所說不同上界边界条件的選擇不会產生原則性不同的結果。上界边界条件如何選擇不但在背風波理論中是重要問題,在其他动力气象問題中也同样是重要的。

参 考 文 献

- [1] De Ver Colson, Results of double-theodolite observation at Bishop, Cal., in connection with "Bishop-wave" phenomena, *Bull. Am. Met. Soc.*, **33** (1952), 107-116.
- [2] Petterssen, S., On the influence of mountain ranges on cyclogenesis, *Bull. Am. Met. Soc.*, **22** (1941), 269-270.
- [3] Yao Chen-sheng (么枕生), The stationary cold fronts of central China and the wave-disturbances developed over the Lake-basin, *Memoir Nat. Res. Inst. Met.*, Academia Sinica, **13**, No. 1, 1939.
- [4] Bolin, B., On the influence of the earth's orography on the general character of the westerlies, *Tellus*, **2** (1950), 184-195.
- [5] Полосян, X. П., Сезонные колебания общей циркуляции атмосферы, *Тр. ЦНП*, **1**: 28 (1947).
- [6] Sutcliffe, R. C., Mean upper contour patterns of northern hemisphere—the thermal-synoptic view-point, *Quart. J. R. Met. Soc.*, **77** (1951), 435-444.
- [7] 顧震潮, 論环流年变与环流基本性質, *气象学报*, **24** (1953), 69-99.
- [8] 叶篤正, 西藏高原对大气环流影响的季節变化, *气象学报*, **22** (1952), 33-47.
- [9] 顧震潮, 西藏高原对东亚环流的动力影响和他的重要性, *中國科学*, **2** (1951), 283-303.
- [10] Corby, G. A., The airflow over mountains. *Quart. J. R. Met. Soc.*, **80** (1954), 491-521.
- [11] Ficker, H. von., Wirbelbildung bei Ballonfahrten im Gebirge. *Met. Zeit.*, **30** (1913), 243-245.
- [12] Georgii, W., Über das stromfeld der Luft im Luv von Gebirge, *Beitr. f. phys. freit. Atm.*, **13** (1927), 280-287.
- [13] Georgii, W., Über Wirbelbildung an Hindernissen der Erdoberfläche, *Beitr. f. Phys. freit. Atm.*, **14** (1928), 191-197.
- [14] Ficker, H. von., 見 Exner, F. M., *Dynamische Meteorologie*, 2te auflage S 74.
- [15] M. Abe (阿部), The formation of cloud by the obstruction of Mount Fuji. *Geophys. Mag.*, Tokyo, **6** (1932), 1-10.
- [16] Larsson, L., Observations of lee wave clouds in the Jämtland Mountains, Sweden. *Tellus*, **6** (1954), 124-138.

- [17] Störmer, C., Mother-of-Pearl clouds. *Weather*, **3** (1948).
- [18] Kuttner J. and Jenkins, C. F., Flight aspects of mountain wave, *U.S. Air Force, Cambridge Res. Center, Air Force Survey in Geophys., No. 35*, 1953 (見 *Met. Abs.*, **5** (1954), 5H-100).
- [19] Jenkins, C. F., Forecasting the mountain waves. *U.S. Air Force, Cambridge Res. Center, Air Force Survey in Geophys.*, No. 15, 1952 (見 *Met. Abs.* **5** (1954), 5H-75).
- [20] Förchtgott, J., Wave streaming in the lee of mountain ridges. *Bull. Met. Tchecosl., Prague*, **3** (1949), p. 49.
- [21] Scorer, R. S., Airflow over mountains, *Sci. Progr.*, **40** (1952), 466-477.
- [22] Malkus J. S. and Bunker, A. F., Observational studies of air flow over Naukucket Island during summer of 1950. *Technical Rep. No. 15* 1951, Woods Oceanographic Institution (見 *Met. Abs.*, **5**, (1954), 5H-77).
- [23] Malkus J. S. and Stern, M. E., The flow of a stable atmosphere over a heated island. (Part I, *J. Met.*, **10** (1953), 30-41. (Part II, *J. Met.*, **10** (1953), 105-120.
- [24] Кибель, И. А., Приложение к метеорологии уравнений гидромеханики бароклинной жидкости. *Изв. АН СССР, сер. геогр. и геофиз.* 1940, № 5.
- [25] Charney, J., On the scale of atmospheric motions, *Geofy. Publikasjoner*, **17** (1948), No. 2.
- [26] Prandtl, L., *The mechanics of viscous fluid, Aerodynamics Theory*, vol. 3, Edited by Durand, 1935.
- [27] Кочин, Н. Е., О влиянии рельефа земли на волны на поверхности раздела двух жидкостей различной плотности., (Статья 1), *Собрание сочинений I*, 1937, 449-465.
- [28] Кочин, Н. Е., О влиянии рельефа земли на волны на поверхности раздела двух масс жидкости различной плотности., (Статья 2), *Собрание Сочинений I*, 1937, 466-477.
- [29] Дорошницян, А. А., Возмущения воздушного потока, вызванные неровностями на поверхности земли, *Тр. ГГО*, вып. 23. 1938.
- [30] Дорошницян, А. А., Некоторые задачи обтекания неровностей поверхности земли воздушным потоком. *Тр. ГГО*, вып. 31. (1940).
- [31] Петренко, Н. В., О влиянии меридиональных горных хребтов на эволюцию циклонов. *Тр. ЦИП*, вып. **7**: 34 (1948).
- [32] Дорошницян, А. А., Влияние рельефа земной поверхности на воздушные течения, *Тр. ЦИП*, вып. **21**: 48 (1950).
- [33] Lyra, G., Über den Einfluss von Bodenerhebungen auf die Strömung einer stabil geschichteten Atmosphäre. *Beitr. phys. frei. Atmos.*, **26** (1940), 197-206.
- [34] Küttner, J., Moazagotl und Föhnwelle, *Beitr. phys. frei. Atm.*, **25** (1939), 79-114.
- [35] Eliassen, A., On the motion of the air over a mountain ridge. *Meteorologische Annalen*, Bd. 1, No. 5 (1942), 101-103.
- [36] Queney, P., Theory of perturbations in stratified currents with application to airflow over mountain barriers. *Chicago Univ., Dept. of Met., Misc. Rep.* (1947), No. 23.
- [37] Queney, P., The problem of air flow over mountains: A summary of theoretical studies, *Bull. Am. Met. Soc.*, **29** (1948), 16-26.
- [38] Scorer, R. S., Theory of waves in the lee of mountains. *Quart. J. R. Met. Soc.*, **75** (1949), 41-56.
- [39] ———, Theory of airflow over mountains: II. The flow over a ridge, *Quart. J. R. Met. Soc.*, **79** (1953), 70-83.
- [40] ———, Theory of airflow over mountains: III-Airstream characteristics, *Quart. J. R. Met. Soc.*, **80** (1954), 417-428.

- [41] Scorer, R. S. , Forecasting the appearance of lee waves *Weather*, 6 (1951), 99-103.
- [42] Кибель, И. А., Пространственная задача обтекания неровностей поверхности земли воздушным потоком, *Доклады АН СССР*, Т. 100, (1955), 247-250.
- [43] Мусаевян, Ш. А. Пространственная задача обтекания неровностей земной поверхности с учётом сферичности земли, *Доклады АН СССР*, Т. 103, (1955), 815-818.
- [44] Palm, E., On the formation of surface waves in a fluid flowing over a corrugated bed and on the development of mountain waves, *Astrophys. Norvegica*, 5 (1952), No. 3.
- [45] Hoiland, E., *Fluid flow over a corrugated bed*, Dept. of Met., UCLA, Appendix A to Rep. on the work under contract AF, (1951), 19 (122)-263.
- [46] Jahnke E. and Emde, F., *Tables of Functions*, 4th Edition Dover Publications, New York, (1945).

TOPOGRAPHICAL EFFECT ON THE AIRFLOW

YEH TU-CHENG

(*Institute of Geophysics and Meteorology*)

ABSTRACT

This paper reviews the observational facts and theories on the airflow over small mountains. Special emphasis is laid to point out and discuss the controversies in the theory of lee waves among different writers. According to present author controversies are due to (1) the difference in scale of the mountain and (2) the choice of the upper boundary condition. When l is comparable to the critical value $L_s/2\pi$, ($L_s = u/\sqrt{(g/\theta)(\partial\theta/\partial z)}$), where l is the half-width of the mountain, lee waves occur. When there is an upper solid lid or a discontinuity in the atmosphere lee waves occur.

In the first case the forced vibration is in resonance with natural vibration. In the second case there can exist only vibrations of certain wave lengths, which appears as those of the lee wave. The physics of lee waves is thus clear.